

Grupo Dental De Berger, P.A.

Instrucciones Postoperatorias De la Descarga:

1. Mantenga la gasa de presión firmemente sobre el sitio operativo por 1-2 horas para reducir la sangría a un mínimo.
2. NO ENJUAGUE el sitio operativo el día de la cirugía. Cepille sus dientes restantes regularmente y mantenga su boca tan limpia como sea posible durante el período que el sitio operativo este curandose.
3. Las aclaraciones salinas calientes de la boca (1 cucharilla llena por completo de sal en un vaso lleno de agua caliente) tres o cuatro veces al día se deben comenzar en el primer día postoperatorio (primer día después de la cirugía). Esto ayudará a promover el curativo. Una vez más NO ENJUAGUE EL DÍA DE LA CIRUGÍA.
4. Si es más cómodo, o le mandan hacer así, coma los alimentos líquidos o suaves, pero NO PARE el ALIMENTO. No falte una sola comida.
5. Paquetes de hielo. Use según dirigido. No utilice después de las primeras 24 horas.
6. Vuelva a esta oficina por requerimiento.
7. No escupa fuertemente, beba a través de una paja ó fume por dos (2) a tres (3) días.
8. Después de su cirugía, el día número dos (2), utilice una jeringuilla para las áreas de extracción en la mandíbula, para enjuagar cada vez después de comer.
9. Medicaciones: Prescripción : _____
 Otro : _____
10. Instrucciones Especiales: _____

Usted Puede Tener:

1. Dolor. En el acontecimiento que usted tiene cierto dolor y la medicación prescrita para usted no le da relevación, por favor entre en contacto con esta oficina en 803-787-9793.
2. Hinchazón. Esto puede ser de un número de causas, pero es generalmente una reacción natural del cuerpo a la cirugía en la cavidad bucal. Si la hinchazón es acompañada con dolor y ocurre antes de su cita siguiente, llame por favor a esta oficina.
3. Sangrar. Limpie su boca con una aclaración apacible de agua, después coloque la gasa de algodón, ALGODÓN NO ABSORBENTE, sobre el área. Ciérre las quijadas firmemente sobre la gasa por 30 minutos, por el reloj. No se excite, sino siga siendo reservado con la gasa en lugar. Si el área continua sangrando después de quitar la gasa, por favor entre en contacto con nuestra oficina en 803-787-9793. A menudo, hay una exudación leve de sangre, que, cuando está mezclada con saliva, puede aparecer que el área esta sangrando excesivamente.
4. Tiesura. Ésta, como la hinchazón, es una reacción natural de su cuerpo a la cirugía. Los ejercicios de abrir y cerrar la boca pueden ayudar a aliviar este problema.
5. Entumecimiento. Infrecuentemente, un individuo notará la sensación entumecida que persiste después de la cirugía de la cavidad bucal. Es generalmente temporal en naturaleza, y una sentimiento normal volverá.